

## Difficultés sensorielles chez les enfants de 0 à 3 ans

*Certains énoncés ne sont pas applicables selon l'âge de l'enfant*

- Présente de la détresse lors du changement de couche particulièrement lorsqu'on le couche sur le dos
- N'aime pas ce qui est trop serré sur lui (enfant de plus de 15 mois)
- Présente de la détresse lorsqu'il se fait laver (cheveux, visage, etc.)
- Présente de la détresse lors de l'habillage ou lorsqu'il doit mettre de nouveaux vêtements (changement de saison)
- N'aime pas se faire prendre
- Ne présente pas de douleur lorsqu'il tombe ou se cogne
- Dégoût prononcé lors des jeux salissants (sable, gouache, etc.)
- Est constamment en mouvement, se berce lui-même, court beaucoup
- Ne peut demeurer un moment à la même activité
- N'a peu ou pas rampé avant la marche (enfant de plus d'un an)
- Les trajets en voiture sont difficiles (pleures importants, vomissements)
- Présente de la peur en présence de sons communs (aspirateur, chasse d'eau, etc.)
- Ne parle pas ou démontre très peu de vocalise et de babillage
- Évite le contact visuel, ne regarde pas le visage de l'autre
- Devient très excité ou s'endort dans une foule, au supermarché, au restaurant, etc. (plus d'un an)
- Erre sans but, n'explore pas son environnement de façon efficace (plus de 15 mois)
- Besoin d'un contrôle total de l'environnement (il dirige le jeu)
- Brise les jouets et les objets sans nécessairement le faire par exprès (plus de 15 mois)
- Difficulté à passer d'une activité à l'autre, transitions difficiles
- Préférences alimentaires marquées, constantes dans le temps, mange moins de 15 aliments

*Si vous avez coché trois (3) ou plus de ces points, votre enfant a peut-être des difficultés sensori-motrices et une intervention en ergothérapie pourrait l'aider.*